

## Les effets secondaires graves des injections expérimentales éclatent au grand jour dans le monde entier



Par Nicole Delépine

Protégeons les injectés ! Qu'ils stoppent cette intoxication et protégeons les enfants ! Que les parents ne les condamnent pas à un avenir incertain !

La plupart des injectés ne veulent pas entendre parler des drames post injections et préfèrent continuer à écouter la pensée magique de Véran et de ses complices malgré leurs mensonges permanents.

Pourquoi ? Difficulté à reconnaître qu'on s'est trompé ? Drame psychologique personnel ? Pourtant, regarder la réalité en face pourrait leur éviter d'aggraver leur état avec les autres doses que Veran veut imposer de plus en plus fréquemment. Il existe manifestement une toxicité cumulative, en particulier en matière de problèmes cardiaques et neurologiques. Tentons de les informer par des tracts, des discussions à la sortie des magasins, pendant les manifestations, etc.

Tentons de les informer le plus doucement et humainement possible, car ce sont des victimes. Victimes du viol des consciences par les médias, les patrons, mais aussi des familles angoissées qui ont harcelé les vaccino prudents jusqu'à ce qu'ils se laissent « convaincre » et deviennent des « malgré nous ».

N'ajoutons pas un jugement de valeur aux pressions subies et mensonges médiatiques répétés qu'ils ont subis. Informons-les pour qu'ils épargnent leurs enfants.

Rappelons d'emblée qu'aussi bien aux USA qu'en UE ou en Grande-Bretagne, ou en Suisse le nombre d'effets délétères est extrêmement élevé par rapport aux complications enregistrées des vax depuis trente ans.

Chercher

Chercher...

Traduire

Sélectionner une langue

Fourni par Google Traduction

Suivez nous



## La MHRA confirme que le Royaume-Uni a enregistré 5 fois plus de décès en 12 mois dus à la vaccination contre le Covid-19 que de décès dus à tous les autres vaccins combinés en 21 ans

PAR L'EXPOSÉ SUR 18 JANVIER 2022 • ( 2 COMMENTAIRES )



Écoute maintenant

Le UK Medicine Regulator a confirmé que sur une période de douze mois, les vaccins Covid-19 ont causé cinq fois plus de décès que le nombre total de décès dus à tous les autres vaccins disponibles combinés au cours des 21 dernières années.

Meilleurs messages



Les données officielles suggèrent que les triples vaccinés développent le syndrome d'immunodéficience acquise à un rythme alarmant



150 000 morts du Covid-19 ? - L'ONS déclare noir sur blanc que seulement 17 000 personnes sont mortes du Covid-19 au cours des 2 dernières années


S'abonner

RECEVOIR DE NOUVEAUX MESSAGES PAR E-MAIL


S'abonner

S'abonner

## VAERS Reported Deaths by Vaccine Type (1988-2021)



- |                 |                 |            |                 |                 |                 |         |
|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| COVID19         | HIBV            | HEP        | OPV             | PNC             | PNC13           | DTAP    |
| FLU3(SEASONAL)  | DTP             | IPV        | FLUX(SEASONAL)  | PPV             | RV5             | UNK     |
| MMR             | DTAPHEPBIP      | HPV4       | DTAPIPVHIB      | RV1             | VARZOS          | DTPHIB  |
| 6VAX-F          | HBHEPB          | VARCEL     | RAB             | FLU4(SEASONAL)  | HPVX            | HEPA    |
| BCG             | MEN             | TDAP       | FLU(H1N1)       | FLUA3(SEASONAL) | RVX             | MNQ     |
| MENB            | YF              | FLUX(H1N1) | DT PHEP         | HPV2            | TD              | DTAPIPV |
| HPV9            | MEA             | TYP        | ANTH            | DT PIPV         | MMRV            | HEPAB   |
| TTOX            | PNC10           | DT         | FLUN3(SEASONAL) | SMALL           | FLUN4(SEASONAL) | DTAPH   |
| FLUC4(SEASONAL) | RV              | HBPV       | FLUN(H1N1)      | LYME            | MENHIB          | PER     |
| DTPIHI          | DTIPV           | MU         | JEV             | MNC             | FLUR4(SEASONAL) | DTPPHIB |
| FLUA4(SEASONAL) | FLUC3(SEASONAL) | JEVX       | MM              | MER             | PLAGUE          | TDAPIPV |
| TBE             | CEE             | CHOL       | JEV1            | RUB             | ADEN_4_7        | DTOX    |
| DPP             | EBZR            |            |                 |                 |                 |         |



Toutes les classes d'âge ont été atteintes par les effets secondaires, y compris les plus âgées

Chez les sujets âgés, à haut risque par leurs pathologies sous-jacentes de tous types (artérite, etc.), la mortalité a été élevée lors des premières doses, mais le lien de causalité directe est systématiquement nié.

Sauf en Norvège

(<https://www.lindependant.fr/2021/01/15/covid-19-la-norvege-annonce-le-deces-de-23-personnes-suite-a-des-injections-du-vaccin-pfizer-9313761.php>), où après la mort post vaccinales de 23 pensionnaires de maison de retraite les autopsies réalisées chez 13 d'entre eux suggéraient que des effets secondaires courants pourraient avoir contribué à des réactions graves chez les personnes âgées fragiles.

À la suite de ces constatations, l'agence sanitaire a recommandé de ne pas injecter les personnes âgées de plus de 80 ans. « *Pour les personnes les plus fragiles, même des effets secondaires relativement légers peuvent avoir des conséquences graves* ». « *Pour ceux qui ont une durée de vie restante très courte de toute façon, les avantages du vaccin peuvent être marginaux ou non pertinents* ».

De nombreux vieillards sont morts rapidement après leur première dose par AVC, infarctus ou « mort subite » en plus des gens âgés en EHPAD ou en HAD « euthanasiés » sans leur volonté au Rivotril (de l'ordre de 10 000).

Et le pouvoir a poussé à les injecter sous prétexte de leur fragilité qui n'a que renforcé les risques de l'injection. Encore maintenant, on entend trop souvent dire qu'on pourrait réserver le « vax » aux plus de 65 ans, alors qu'il existe des traitements précoces efficaces et que les plus vieux restent des citoyens à part entière qui ont aussi la liberté de penser et d'accepter

ou non ce poison. S'exonérer d'un refus total de ces thérapies géniques est inacceptable...

Chez les gens de tous âges porteurs d'une maladie chronique, on note de plus en plus des aggravations de ces pathologies spécifiques : cancers([1] Thérapies géniques anticovid et cancers – Docteur Nicole Delépine (nicoledelepine.fr) )) (y compris en rémission avec évolution rapide), maladies neurologiques de type SEP, etc., et autres auto-immunes de tous genres.

Chez les plus jeunes, la survenue de myocardites([2] MYOCARDITES POST VACCIN COVID : RISQUE INACCEPTABLE CHEZ L'ENFANT QUI NE RISQUE RIEN DU VIRUS – Docteur Nicole Delépine (nicoledelepine.fr) )) post injections a rapidement été notée, d'autant plus fréquente que le « vacciné » est plus jeune et en particulier chez les adolescents. Nous sommes très inquiets pour les plus petits qui commencent à être injectés sans raison sanitaire réelle.

Chez les femmes, de nombreux troubles des cycles menstruels qui durent, fausses couches augmentées de façon importante, naissance de nouveau-nés qui décèdent rapidement dans le mois qui suit la naissance, ont rapidement attiré l'attention depuis les premiers mois des injections, qui auraient dû faire interrompre les vax de la part du corps médical et refuser de la part des citoyens, et imposer au minimum un moratoire.

*Point actuel sur les chiffres publiés sur différents sites officiels*

# COVID-19 INJECTION DAMAGE OFFICIAL FIGURES (DEC 2021)

	UK <sup>1</sup>	EU <sup>2</sup>	US <sup>3</sup>
<b>DEATHS</b>	<b>1,822*</b>	<b>32,652*</b>	<b>19,532*</b>
<b>INJURIES</b>	<b>1,314,659*</b>	<b>2,970,644*</b>	<b>4,421,178*</b>
	(to 1 <sup>st</sup> Dec)	(to 4 <sup>th</sup> Dec)	(to 26 <sup>th</sup> Nov)

\*1 - 10% of real figures (Gov't est.)

**Sources:** <sup>1</sup> MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency)

<sup>2</sup> EMA (European Medicines Agency)

<sup>3</sup> VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)

For more information please visit: [doctors4covidethics.org](https://doctors4covidethics.org)

*Selon le site américain VAERS*

VAERS data des Centers for Disease Control & Prevention

Total de 1 071 856 déclarations d'événements indésirables dans tous les groupes d'âge après injection anti-COVID :

22 607 décès et 178 994 événements graves entre le 14 décembre 2020 et le 21 janvier 2022.

## Search Results

From the 1/21/2022 release of VAERS data:

**Found 1,071,856 cases where Vaccine is COVID19**

[Government Disclaimer on use of this data](#)

Table

↓	↑ ↓	
Event Outcome	Count	Percent
Death	22,607	2.11%
Permanent Disability	40,069	3.74%
Office Visit	166,737	15.56%
Emergency Room	99	0.01%
Emergency Doctor/Room	115,237	10.75%
Hospitalized	121,276	11.31%
Hospitalized, Prolonged	321	0.03%
Recovered	307,909	28.73%
Birth Defect	870	0.08%
Life Threatening	25,776	2.4%
Not Serious	471,502	43.99%
<b>TOTAL</b>	† 1,272,403	† 118.71%

† Because some cases have multiple vaccinations and symptoms, a single case can account for multiple entries in this table. This is the reason why the Total Count is greater than 1071856 (the number of cases found), and the Total Percentage is greater than 100.

### *Les données DMED (pharmaco vigilance des armées américaines) ont fuité*


Avec les principaux effets secondaires constatés par comparaison aux années antérieures. Précisons qu'il s'agit d'une population jeune en bonne santé donc ces chiffres sont particulièrement inquiétants. ([3] Il y a une tentative de relativiser en changeant l'année de comparaison, mais ces chiffres restent instructifs))

- Tachycardie : augmentation de 202 %
- Cancer du testicule : augmentation de 269 %
- Dysfonctionnement ovarien : augmentation de 337 %
- Migraines : augmentation de 352 %
- Embolie pulmonaire : augmentation de 368 %
- Infertilité féminine : augmentation de 372 %
- Néoplasmes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines : augmentation de 374 % 08
- Démyélinisation : augmentation de 387 %
- Cancer du sein : augmentation de 387 %
- Syndrome de Guillain-Barré : augmentation de 451 %
- Tumeurs malignes des organes digestifs – augmentation de 524 %

- Sclérose en plaques : augmentation de 580 %
- Tumeurs malignes de l'œsophage : augmentation de 794 %
- Maladies du système nerveux : augmentation de 948 %
- Hypertension : augmentation de 2 081 %

## Myocardites en fonction de l'âge rapportées par le VAERS

Les atteintes cardiaques ont été les premières à inquiéter sérieusement les Israéliens au début des injections massives. Elles ont été rapidement constatées aux USA et demeurent un drame terrible pour les jeunes particulièrement touchés dont parallèlement les risques du covid lui-même étaient zéro. ([2] MYOCARDITES POST VACCIN COVID : RISQUE INACCEPTABLE CHEZ L'ENFANT QUI NE RISQUE RIEN DU VIRUS – Docteur Nicole Delépine (nicoledelepine.fr) ) Insistons sur le fait que l'atteinte cardiaque même si elle ne tue pas tous les patients affectés reste une lésion définitive qui va compromettre l'espérance de vie du sujet très probablement et en tous cas le rendre incapable d'activités sportives intenses.



## Taux d'effets secondaires : les chiffres sur le site du gouvernement du Canada

Des effets secondaires graves post-vaccination « par 100 000 doses administrées et non par 100 000 personnes »

Effets secondaires dont certains sont potentiellement mortels	Personnes ayant présentées des effets secondaires - Cumulatif (par 100 000 doses administrées) (21-01-2022)	Pourcentages Effets secondaires (par 100 000 doses administrées)
<b>Syndrome de Guillain-Barré</b> <i>(potentiellement mortel)</i> <i>Atteinte des nerfs périphériques caractérisés par une paralysie progressive, parfois jusqu'à atteindre les muscles de la respiration puis les nerfs de la tête et du cou.</i>	116	0,116 %
<b>Thrombocytopénie</b> <i>Affection caractérisée par un nombre de plaquettes en dessous de la normale.</i>	63	0,063 %
<b>Arrêt cardiaque</b> <i>(potentiellement mortel)</i> <i>Perte de conscience brutale avec disparition du pouls, causée par l'incapacité soudaine du cœur à propulser le sang vers le cerveau et vers le reste du corps.</i>	40	0,040%
<b>Insuffisance cardiaque</b> <i>(potentiellement mortelle)</i> <i>Incapacité du muscle cardiaque à assurer normalement son rôle de propulsion du sang dans l'organisme.</i>	45	0,045 %
<b>Infarctus du myocarde</b> <i>(potentiellement mortel)</i> <i>Destruction d'une partie du muscle cardiaque.</i>	104	0,104 %
<b>Myocardite (1) / Péricardite (2)</b> <i>(potentiellement mortelles)</i> <i>(1) Inflammation du tissu musculaire du cœur entraînant la mort tissulaire.</i> <i>(2) Épanchement de liquide et de composants sanguins dans l'espace péricardique.</i>	1 680	1,680 %
<b>Thrombose veineuse cérébrale</b> <i>(potentiellement mortelle)</i> <i>Caillot de sang qui s'est formé ailleurs dans l'organisme puis qui a migré jusqu'à atteindre une artère ou une veine cérébrale.</i>	18	0,018 %
<b>Thrombose cérébrale</b> <i>(potentiellement mortelle)</i>	10	0,010 %

<b>Effets secondaires dont certains sont potentiellement mortels</b>	<b>Personnes ayant présentées des effets secondaires - Cumulatif (par 100 000 doses administrées) (21-01-2022)</b>	<b>Pourcentages Effets secondaires (par 100 000 doses administrées)</b>
<b>Vascularite cutanée</b> <i>Trouble inflammatoire qui affecte la paroi des vaisseaux sanguins dans la peau.</i>	33	<b>0,033 %</b>
<b>Thrombose veineuse profonde (potentiellement mortelle)</b> <i>Formation d'un caillot sanguin au sein du réseau veineux.</i>	274	<b>0,274 %</b>
<b>Embolie (potentiellement mortelle)</b> <i>Blocage causé par un caillot sanguin.</i>	16	<b>0,016 %</b>
<b>Hémorragie</b> <i>Écoulement de sang qui ne s'arrête pas.</i>	62	<b>0,062 %</b>
<b>Embolie pulmonaire (potentiellement mortelle)</b> <i>Obstruction d'une ou plusieurs artères irriguant le poumon.</i>	402	<b>0,402 %</b>
<b>Thrombose (potentiellement mortelle)</b> <i>Formation d'un caillot sanguin au sein du réseau veineux.</i>	273	<b>0,273 %</b>
<b>Syndrome de thrombose avec thrombocytopénie (potentiellement mortel)</b> <i>Caillots et baisse du nombre de plaquettes dans le sang.</i>	107	<b>0,107 %</b>
<b>Insuffisance rénale aiguë (potentiellement mortelle)</b> <i>Diminution rapide de la fonction rénale.</i>	51	<b>0,051 %</b>
<b>Glomérulonéphrite (1) et syndrome néphrotique (2)</b> <i>(1) Inflammation des reins (2) Troubles rénaux</i>	14	<b>0,014 %</b>
<b>Lésion du foie</b> <i>Inflammation du foie.</i>	30	<b>0,030 %</b>

Selon le site de l'ANSM pour la France

V02/01/22  
SYNTHÈSES  
En France - À partir du  
27/12/2020

- Nombre injections ARNm et décès Covid-19 / tranches d'âge  
- Effets indésirables graves des injections ARNm C-19  
- Décès toutes causes 2003, 2016, 2019, 2020, 2021

Réalisation du tableau : @31Sandel / sandelnews@gmail.com

Ce fichier-synthèse permet de mettre en lien différentes données, et de méditer sur les différents récits que ces liens produisent. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des remarques ou des idées pour améliorer ce fichier.

SOURCES, DÉCÈS COVID À L'HOPITAL : <https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicateur> (Critères : Données hospitalières par déclarations / Nombre cumulé de décès par âge).  
CHIFFRES EPADH : <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-relatives-a-lepidemie-de-covid-19-en-france-vue-densemble/>  
EFFETS INDÉSIRABLES VACCINS COVID-19 : <https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-d-effets-indesirables-des-vaccins> (Dernière MAJ de « Chiffres clefs et faits marquants »)

PS : Ce fichier synthétise des données officielles (issues du passé) sur une page A4. Chacun est LIBRE de les questionner en les croisant avec d'autres sources : décès « avec » ou « du » Covid-19, impact du « Rester chez vous avec du doliprane », de l'usage du Rivotril en Epadh en 2020, de l'hygiène des mains et masques, etc. Ce fichier ne précise pas les comorbidités et fragilités des personnes déclarées décédées du Covid-19 (ni les traitements qu'ils ont eu ou pas). Par contre, il peut aider à méditer sur le bénéfice / risque par tranche d'âge de ces injections (au vu des IEGraves - voir rapports ANSM détaillés par produits). Au vu des chiffres (décès), en dessous de 50 ans ou 60 ans, la question peut se poser.

Ce fichier NE PERMET PAS d'analyser si les injectés ou non-injectés ont plus de risques d'aller à l'hôpital, formes graves, etc ; ni d'évaluer l'efficacité ou pas de ces injections en 2021 (seuls les décès déclarés en Epadh ont diminué).

27/12/20 au 02/01/2022

SOURCE : [www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-relatives-aux-personnes-vaccinees-contre-la-covid-19-1/](http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-relatives-aux-personnes-vaccinees-contre-la-covid-19-1/). (Fichier : vacci-tot-a-fra.csv)

Tranches d'âge	1ère injection	2ème inj.	3e injection
ANNONCES GOUVERNEMENT : 15/6/21 : ouverture de la vaccination aux 12/18 ans - Sept 21 : ouverture 3e dose au 65+ puis à tous les 18+ - Dec 21 : ouverture vaccination des 5/11 ans « les plus fragiles ».			
0-4ans (je 30/11/21)	5 167	2 581	155
0-4ans (après 30/11/21)	267	556	345
5-9 ans (je 30/11/21)	2 134	666	24
5-9 ans (après 30/11/21)	19 452	1 775	70
10-11 ans (je 30/11/21)	17 560	14 862	144
10-11 ans (après 30/11/21)	21 743	3 568	399
TOTAL 0/12 ANS	66 323	24 008	1 137
12-17 ans (je 15/8/21)	110 813	10 532	0
12-17 ans (après 15/8/21)	3 960 121	3 888 196	115 376
TOTAL 12/17 ANS	4 070 934	3 898 728	115 376
18-24 ans	5 138 771	4 978 949	1 300 972
25-29 ans	3 471 373	3 363 466	866 219
TOTAL 12/29 ANS	8 610 144	8 342 415	2 167 191
30-39 ans	7 426 834	7 227 089	2 192 064
40-49 ans	7 847 679	7 700 639	3 137 015
TOTAL 25/49 ANS	15 274 513	14 927 728	5 329 079
50-59 ans	8 228 019	8 113 213	4 396 310
60-64 ans	3 810 187	3 766 084	2 470 488
TOTAL 50/64 ANS	12 038 206	11 879 297	6 866 798
65-69 ans	3 574 034	3 536 379	2 621 740
70-74 ans	3 454 066	3 418 992	2 719 857
75-79 ans	2 186 500	2 161 204	1 766 480
80 et +	3 653 046	3 576 890	2 749 657
TOT 65+ ANS	12 867 646	12 693 465	9 857 734
TOTAUX	52 927 766	51 765 641	24 337 315

15/12/21 : perte pass pour 65+ si pas 3e dose. 15/1/22 : perte pass pour 18+ si pas 3D.

1D n'ayant pas fait la 3D : perte du pass social

(3 837 799) 25 %

(2 606 154) 25 %

(5 442 953) 25 %

(5 234 770) 30 %

(4 710 864) 40 %

(9 945 434) 35 %

(3 831 706) 53 %

(1 339 699) 65 %

(5 171 408) 57 %

(952 294) 73 %

(734 209) 79 %

(420 020) 81 %

(903 389) 75 %

(3 009 912) 77 %

(24 569 707) 46 % TOT

1/3/2020 au 02/01/22

[Il faudrait pouvoir détailler : avec ou sans comorbidités, fragilités...]

Décès déclarés Covid-19 à l'hôpital depuis mars 2020 (GEODES + DATA.GOUV)	2020 Année C-19 (10 mois)	2021 Année vaccin	2022 (En cours)
0 / 9 ans	4	9	0
TOT 0/9	4	9	0
10 / 19 ans	6	9	0
20 / 29 ans	37	71	0
TOT 10/29	43	80	0
30 / 39 ans	151	209	0
40 / 49 ans	450	600	0
TOT 30/49	601	809	0
50 / 59 ans	1 578	2 167	0
60 / 69 ans	4 751	6 254	0
TOT 40/69	6 329	8 421	0
70 / 79 ans	9 844	12 179	0
80 / 89 ans	17 553	18 850	0
90 + ans	10 194	10 886	106
EPADH 80+	19 780	7 301	0
TOT 70/...	57 371	49 216	106
TOTAUX	64 348	58 535	106

27/12/20 au 9/12/21

[Envoi sur demande de mon fichier-synthèse ANSM détaillé]

ANSM - Effets indésirables déclarés des vaccins Covid-19	
Nbre injectés 1 dose. 9/12/21	52 393 416
EIG - Effets indésirables GRAVES déclarés	29 538
Moy EIG / mois	2 616
% EIG par aux V 1d	0,056 %
5,6 IEG / 10.000 personnes	
1 IEG potentiel / 1773 pers. 1D	
Nombre total I (graves et non graves) déclarés	121 476
% des EI par V 1d	0,232 %
1 IE potentiel / 431 personnes 1D	
Effets Indésirables GRAVES = décès, AVC, arrêt cardiaque, convulsions, hypertension, thromboses veineuses cérébrales, thromboses diverses, embolie pulmonaire, encéphalites, méningoencéphalites, paralysies faciales, choc allergique, myocardites et péricardites, troubles du rythme et de la conduction, hépatites, pancréatites, épilepsie, syndrome de Guillain-Barré, maladie de Creutzfeldt-Jakob (« vache folle »), glaucomes, perte vision et audition, néphropathies, pathologies démyélinisante, zona et herpès...	

En date au 6/12/21

SOURCE : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487988?geo=FRANCE&table=1>

Total Décès TOUTES CAUSES					
Un texte intéressant à lire sur les comparaisons entre années, chiffres attendus, effet moisson... <a href="http://recherche.irsan.fr/fr/">http://recherche.irsan.fr/fr/</a> (analyse surmortalité 2020)					
	2003 Canicule	2016 Grippe forte	2019	2020	2021 (En cours)
0 / 24 ans	9 066	6 567	6 363	5 994	5 677
25 / 49 ans	34 282	22 862	21 822	21 716	19 991
TOT 0/49	43 348	29 429	28 185	27 710	25 668
50 / 64 ans	67 946	70 052	66 943	68 828	63 536
TOT 50/64	67 946	70 052	66 943	68 828	63 536
65 / 74 ans	87 776	84 903	93 998	103 488	96 998
75 / 84 ans	169 755	135 430	130 884	144 329	133 435
85+ ans	193 642	274 051	293 412	324 744	286 902
TOT 65/85+	451 173	494 384	518 294	572 561	517 335
Par mois	46 872	49 489	51 119	55 758	50 545
Par jour	1 537	1 623	1 676	1 828	1 657

Selon le site de l'UE 27 pays



## EudraVigilance - European database of suspected adverse drug reaction reports

The European Medicines Agency publishes these data so that its stakeholders, including the general public, can access information that European regulatory authorities use to review the safety of a medicine or active substance. **Transparency** is a key guiding principle of the Agency.

### COVID-19 Vaccine Adverse Drug Reactions

# 38,983 DEAD

## 3,530,362 Injuries Through Jan 29, 2022

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)



EUROPEAN MEDICINES AGENCY  
SCIENCE MEDICINES HEALTH

EudraVigilance

EudraVigilance - European database of suspected adverse drug reaction reports		EUROPEAN MEDICINES AGENCY SCIENCE MEDICINES HEALTH				
Last Update: Jan 29, 2022	Reported Cases	Fatalities	% fatalities to cases	All Multiple Symptoms	Serious injuries	% serious to ALL
<b>Pfizer-BioNTech</b>	736 206	17 578	2,39%	1 704 757	759 707	44,56%
<b>Oxford/AstraZeneca</b>	444 437	7 977	1,79%	1 154 757	600 777	52,03%
<b>Moderna</b>	220 440	11 008	4,99%	543 543	262 379	48,27%
<b>Janssen</b>	49 182	2 420	4,92%	127 305	50 009	39,28%
<b>Total:</b>	<b>1 450 265</b>	<b>38 983</b>	<b>2,69%</b>	<b>3 530 362</b>	<b>1 672 872</b>	<b>47,39%</b>

Et dans le détail des pathologies

Nombre de décès						
15/01/2022	Troubles	Moderna	Pfizer	Astrazeneca	Jansen	Total général
	Troubles sanguins et lymphatiques	118	238	271	48	675
	Troubles cardiaques	1 110	2 459	812	196	4 577
	Troubles congénitaux, familiaux et génétiques	9	52	7	1	69
	Troubles de l'oreille et du labyrinthe	6	11	8	3	28
	Troubles endocriniens	6	5	5	1	17
	Troubles oculaires	36	38	31	10	115
	Problèmes gastro-intestinaux	399	673	422	88	1 582
	Troubles généraux et anomalies au site d'administration	3 551	4 871	1 826	659	10 907
	Troubles hépatobiliaires	54	85	67	13	219
	Troubles du système immunitaire	20	88	37	10	155
	Infections et infestations	1 031	1 829	591	198	3 649
	Blessures, intoxications et complications liées aux procédures	205	321	195	25	746
	Enquêtes	390	492	200	127	1 209
	Troubles du métabolisme et de la nutrition	260	271	122	56	709
	Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif	215	209	157	54	635
	Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (v compris kystes et polypes)	81	144	38	8	271
	Troubles du système nerveux	1 007	1 807	1 142	242	4 198
	Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales	8	72	19	1	100
	Problèmes de produit	4	3	1	0	8
	Troubles psychiatriques	178	198	69	21	466
	Troubles rénaux et urinaires	211	261	72	29	573
	Troubles de l'appareil reproducteur et du sein	9	7	3	6	25
	Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux	1 142	1 833	1 035	293	4 303
	Affections de la peau et du tissu sous-cutané	95	140	61	10	306
	Circonstances sociales	45	22	8	4	79
	Interventions chirurgicales et médicales	199	185	29	72	485
	Troubles vasculaires	393	740	521	167	1 821
	<b>Total :</b>	<b>10 782</b>	<b>17 054</b>	<b>7 749</b>	<b>2 342</b>	<b>37 927</b>
				<b>Sur 4 jours : +</b>		<b>400</b>

*Drame chez les enfants pourtant à risque zéro du covid :*

Via [t.me/vaccinosceptique](https://t.me/vaccinosceptique)

## Analyse de l'évolution des Effets indésirables (EI) chez les enfants (mineurs) du 19.05.2021 au 04.09.2021

t.me/VaccinoSceptique

Au 04.09.2021 :

**31 décès de mineurs ont été déclarés comme EI** dans la base européenne Eudravigilance (ADR report).

+ 94 % depuis le 19/07 alors que le nombre de décès adulte n'a augmenté que de 7 %.

Ces décès ont principalement concernés le 12-17 ans (56%)

04.09.2021		Pfizer	Astra	Moderna	Janssen	Total global	var / juillet	var / mai
EI (effets indésirables)	Total EI	249901	249901	107061	25851	632714	7%	50%
EHG (graves)	Total EHG	159590	188793	52903	8667	409953	24%	96%
Fatals	Total décès	4520	2717	3545	503	11285	7%	61%
	0 - 1 mois	6	3	1	0	10	67%	900%
	2 mois - 2 an	2	1	0	0	3	0%	200%
	3 - 11 ans	0	0	0	0	0		
	12 - 17 ans	14	2	2	0	18	157%	800%
	Mineurs	22	6	3	0	31	94%	675%
	18 - 64 ans	878	1086	857	236	3057	31%	140%
	65 - 85 ans	2026	1125	1718	180	5049	10%	75%
	+ 85 ans	1336	275	873	33	2517	-16%	3%
	Non spécifiés	230	215	94	54	593	-5%	43%

105 mineurs ont failli perdre la vie (pronostic vital engagé) suite au vaccin : + 133 %

### Le résultat de ces EI :

- 47 mineurs ont été déclarés comme présentant des séquelles définitives (+176 % depuis le 17.07.2021)
- 1089 mineurs n'ont pas de résultat connu par les autorités (perdu de vue). Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce statut n'est pas du tout provisoire puisque ce décompte n'a fait qu'augmenter de 475 % depuis le 19 mai.
- 2989 mineurs sont en cours de résolution et sans évolution

Recovering	Total	69312	81417	26343	9387	186459
En cours de résolution	0 - 1 mois	19	63	6	0	88
	2 mois - 2 an	42	42	9	2	95
	3 - 11 ans	7	15	1	1	24
	12 - 17 ans	1064	25	60	11	1160
	Mineurs					1307
Not recovered	Total	91568	96704	37760	11418	237450
Sans évolution	0 - 1 mois	17	50	6	2	75
	2 mois - 2 an	76	61	12	1	150
	3 - 11 ans	15	20	4	1	40
	12 - 17 ans	1232	34	79	12	1357
	Mineurs					1622

**2885 mineurs ont été victimes d'effets indésirables graves** dont **36 %** avaient moins de 12 ans (alors même que l'autorisation n'a pas encore été accordée pour ces catégories d'âge)

Cela représente une augmentation de 80 % depuis 17.07.21 et de 214 % depuis le 19 mai 2021.

Pour la classe 12-17 ans, cela représente une augmentation de 139 %

Grave	Total	159590	188793	52903	8667	409953	24%	96%
	0 - 1 mois	43	165	13	2	223	26%	58%
	2 mois - 2 an	108	271	23	1	403	19%	61%
	3 - 11 ans	19	229	30	0	258	5%	11%
	12 - 17 ans	1717	144	125	15	2001	139%	574%
	Mineurs					2885	80%	214%



816 mineurs ont été hospitalisés, soit + 176 % depuis le 17 juillet.

Hospitalisation	Total	29378	20929	16818	3322	70447	30%	174%
0 - 1 mois	13	14	6	1	34	127%	1033%	
2 mois - 2 an	16	14	8	0	38	52%	443%	
3 - 11 ans	2	10	2	0	14	40%	367%	
12 - 17 ans	685	12	29	4	730	192%	1252%	
<b>Mineurs</b>					<b>816</b>	172%	1118%	

Les mineurs ont été touchés par des effets graves et peu courant chez les enfants ( % d'évolution depuis le 17.07.2021)

- Covid symptomatologique : 54 mineurs (+195 % depuis 17.07)
- Zona : 59 mineurs (+321 % depuis le 17,07)
- Thromboses ou embolies graves : 75 (+121 % depuis le 17.07)
- Hémorragies ou saignement graves : 32
- Péricardites ou myocardites : 303 mineurs (+212%)
- Attaque cardiaque : 12 enfants (0 au 17.07)
- Rupture d'anévrisme ou attaque cérébrale : 8 enfants (+100%)
- Surdité ou perte de l'audition : 19 mineurs (+111%)
- Cécité ou incident sur la rétine : 17 mineurs (+143%)
- Paralysie totale ou partielle : 32 (+300%)
- Douleurs gravement invalidantes : 253 mineurs (+40%)



### Problématique de fertilité et pour les femmes enceintes

L'analyse des types d'effets indésirables met largement en avant les problématiques de fertilité et d'impact sur la grossesse. Les fausses couches ont augmenté de 365 % depuis le 19 mai.

		Pfizer	Astra	Moderna	Jansen	total	Variation
Fausses couches 19.05	Total	173	58	48	4	283	
Fausses couches 17.07	Total	417	187	284	8	896	217%
Fausses couches 04.09	Total	697	257	349	12	1315	47%
Total							365%

En comparaison, dans la même base de données, l'ensemble des vaccins contre la grippe n'ont entraîné que 119 fausses couches en 17 ans (depuis 2004), sachant que les femmes enceintes constituent une des populations cibles pour ces vaccins.

Il y a également eu 201 accouchements prématurés

[t.me/VaccinoSceptique](https://t.me/VaccinoSceptique)

Accouchement prématuré (premature) au 04.09	78	61	58	4	201
Troubles menstruels sévères (menstrua or amenorrh) 17.07	2609	3564	462	46	6681
Troubles menstruels sévères (menstrua or amenorrh) 04.09	5560	4518	1999	85	12162

Pour les troubles menstruels graves, ceux ci ont touchés au 4 sept : 12162 femmes, avec une augmentation de 82 % depuis le 17 juillet.



**+25%**  
d'augmentation  
pour la semaine

Depuis le début de la vaccination, en Europe, ce sont **241** garçons et filles, âgés de 0 à 17 ans qui sont décédés des suites de la vaccination contre la maladie dite Covid-19.

**142** sont morts d'une injection Pfizer  
**29** sont morts d'une injection Moderna  
**25** sont morts d'une injection Astra-Zeneca  
**25** sont morts d'une injection Janssen

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022, **11604** déclarations d'effets secondaires ont été enregistrées.

Luxembourg, le 30 janvier 2022

Source: <https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages>

[www.efvv.eu](http://www.efvv.eu)

## DRAME CHEZ LES SPORTIFS

<https://etouffoir.blogspot.com/2022/01/vaccins-des-sportifs-et-des-athletes-du.html?m=>

VACCINS –Des sportifs et des athlètes du monde entier perdent leur carrière, leur santé et parfois leur vie, par suppression tyrannique de leur droit à disposer d'eux-mêmes.

## Conclusion

Il est évident que l'accumulation des effets secondaires déclarés dans le monde n'est plus possible à résumer en un article, tant les données sont importantes en nombre et qualité. Ce petit résumé a pour but de rappeler la dangerosité de ces injections toujours expérimentales et donc d'aider à résister à l'injection de commodité par lassitude du harcèlement.

Mais comme le répète Mike Yeadon inventeur de la technique et lanceur d'alerte inquiet des conséquences de sa création, l'effet de l'injection est

irréversible, tant pour les conséquences rapides que surtout pour les effets à long terme.

Protégez vos enfants. REFUSEZ TOUTE INJECTION.

---